

★ โรคไข้เลือดออก



เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ

ไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร
ปวดศีรษะ อาเจียน



تبโต มักกดเจ็บบริเวณ
ชายโครงขวา



มีผื่น จุดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ



การรักษา



ใช้ยาลดไข้ พาราเซตามอล
ห้ามใช้ยาแอสไพริน

ควรดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



หากมีอาการปวดท้อง ซึม กระสับ
กระส่าย มือเท้าเย็น ไข้ลด
ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที



การป้องกัน

หากมีอาการน่าสงสัย
ควรรีบพบแพทย์



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงกำจัด
ภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้ทรายกำจัด
ลูกน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บ้านให้สะอาด



ป้องกันยุงกัด นอนใน
มุ้งหรือติดมุ้งลวดใน
บ้านและทายากันยุง

